

Decisioni seduta del 22 Febbraio 2010.

SOSPESI

TRABECTEDINA: necessità di avere informazioni aggiuntive riguardanti il rapporto costo-beneficio favorevole del farmaco.

SOSPESO

PEMETREXED (Alita®): trattamento in I linea per pazienti affetti da NSCLC ad istologia non squamosa.

La Commissione decide di inserire il farmaco per l'indicazione in oggetto, limitatamente al numero di cicli previsti nella budget impact definita dalla ditta e dal NICE.

INSERITO CON NOTA LIMITATIVA - “nel trattamento in I linea per pazienti affetti da NSCLC ad istologia non squamosa limitatamente a 4 cicli di trattamento”.

LEVODOPA/CARBIDOPA (DUODOPA) ®:

INSERITO CON NOTA LIMITATIVA “utilizzo in III linea, cioè in casi di Parkinson complicato, dopo il trattamento orale convenzionale e dopo apomorfina o qualora quest'ultima sia controindicata”. – ATTIVAZIONE SCHEDA DI PRESCRIZIONE REGIONALE – VERIFICA SEMESTRALE DELLE SCHEDE

ZIPRASIDONE IM:

NON INSERITO. Le ASL/AO/IRCCS hanno la possibilità di tenere una minima scorta di farmaco da riservare ai pazienti non trattabili con aripiprazolo im o olanzapina im, su consulenza specialistica.

ICATIBANT:

INSERITO CON NOTA: la prescrizione, distribuzione e somministrazione del farmaco deve essere fatta attraverso il sistema informatico delle malattie rare.

LARONIDASI:

INSERITO CON NOTA: la prescrizione, distribuzione e somministrazione del farmaco deve essere fatta attraverso il sistema informatico delle malattie rare.

NUOVE RICHIESTE INSERIMENTO

DARUNAVIR Nuovo dosaggio con indicazione nei pazienti naive

INSERITO CON NOTA LIMITATIVA - “nei pazienti naive con storia clinica di eventi gastrointestinali”.

**ETRAVIRINA
INSERITO**

PARACALCITOLO: nuova via di somministrazione orale

INSERITO CON NOTA LIMITATIVA: “limitatamente ai pazienti con insufficienza renale cronica negli stadi 3-4-5 della classificazione kDOQI in terapia conservativa o in dialisi peritoneale con effetti collaterali (conseguenti di solito all’ipercalemia) legati all’uso degli altri preparati di vit. D disponibili”.

CARBETOCINA

INSERITO CON NOTA LIMITATIVA: limitatamente alle categorie di pazienti ad alto rischio di emorragia post-partum: pazienti con placenta previa, parto gemellare o parto pretermine prima della trentaduesima settimana.

ZOFENOPRIL: utilizzo per il trattamento dell’ipertensione arteriosa lieve o moderata e per l’infarto del miocardio in pazienti non trombolisati ed emodinamicamente stabili. Gli studi clinici non forniscono complessivamente un significativo valore aggiunto rispetto alla conoscenza ormai maturata con l’esperienza clinica con altri farmaci della categoria. Solo in casistiche molto limitate sono stati documentati possibili effetti antiossidanti e antiaterosclerotici. Viceversa dal punto di vista economico è l’ACE inibitore che ha il costo territoriale più elevato e che ad oggi non ha, pur a brevetto scaduto, in commercio alcun generico.

NON INSERITO.

IVABRADINA:

INSERITO CON NOTA LIMITATIVA: “limitatamente a pazienti non responders o intolleranti a betabloccanti con compilazione del piano terapeutico da parte del specialista cardiologo”