



TARLO ASIATICO DEL FUSTO

Insetto esotico che uccide gli aceri e molte altre latifoglie!

Segni di infestazione

Descrizione: Adulto (da 2,5 a 3,5 cm lunghezza) di colore nero lucido con macchie bianche sul dorso; dotato di lunghe antenne a bande nere e bianche.

Come adulto è presente nel periodo da maggio a ottobre.



Nicchia di ovideposizione: è una piccola abrasione circolare sulla corteccia del fusto e dei rami; appena realizzata (nel periodo estivo) è facilmente visibile mentre poi (nel periodo autunnale-invernale) si presenta annerita e parzialmente cicatrizzata.



Tarlo asiatico del fusto
(*Anoplophora glabripennis*)



Foro di uscita circolare
(1 - 1,5 cm di diametro)
dell'insetto adulto



Sezione di un tronco con
profonde gallerie scavate
dalle larve del *Tarlo*
asiatico del fusto

Per combattere la presenza del *Tarlo asiatico del fusto* nel territorio regionale è necessaria la collaborazione di tutti

- ✓ **Segnala tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale** la presenza di insetti adulti o di piante con sintomi di attacco; il Servizio Fitosanitario provvederà alla verifica del caso segnalato e all'eventuale abbattimento della pianta;
- ✓ **Non mettere a dimora** (nella Zona delimitata*) le piante sensibili appartenenti alle seguenti specie: Acero (*Acer spp.*), Betulla (*Betula spp.*), Ippocastano (*Aesculus spp.*), Pioppo (*Populus spp.*), Salice (*Salix spp.*), Katsura (*Cercidiphyllum japonicum*), Olmo (*Ulmus spp.*);
- ✓ **Non trasportare legname e ramaglia di potature al di fuori della zona delimitata se non finemente sminuzzato** (dimensioni non superiori ai 2,5 - 3 cm di lunghezza e 1 cm di spessore);
- ✓ **Non movimentare legna da ardere** al di fuori della zona delimitata.

chiama subito: